



TYTUŁ: Rotacja pastwisk - praktyczne wskazówki dla hodowców kóz i owiec, jak zmniejszyć częstotliwość stosowania leków przeciwwrobaczych

Rotacja pastwisk, czyli wypas rotacyjny, to praktyczna strategia zarządzania wypasem, w której owce i kozy są systematycznie przemieszczane przez szereg podzielonych pastwisk, co pozwala wypasanim obszarom na regenerację. Takie podejście poprawia produktywność pastwisk, wykorzystanie paszy i trwałość poprzez zapobieganie nadmiernemu wypasaniu i promowanie równomiernych wzorców wypasu. W praktyce producenci stosują tymczasowe lub stałe ogrodzenia, aby tworzyć wiele pastwisk, przenosząc zwierzęta co kilka dni w zależności od dostępności paszy i tempa wzrostu roślin. Dostęp do wody jest zapewniany za pomocą stałych lub przenośnych systemów, aby wspierać częste przemieszczanie zwierząt.

Kluczową zaletą tej metody jest redukcja zanieczyszczenia pastwiska przez pasożyty. Rotacja owiec i kóz na nowe, wcześniej nieużywane pastwiska odbywa się przed wydaleniem do środowiska jaj pasożytów i rozwinięciem się z nich larw inwazyjnych (zwykle w ciągu 4–5 dni), co minimalizuje ryzyko spożycia pasożytów przez zwierzęta. Okresy odpoczynku między wypasaniem dają czas na obumarcie larw pasożytów, co dodatkowo zmniejsza presję inwazji. System ten sprzyja również poprawie zdrowia zwierząt i może zmniejszyć konieczność stosowania leków przeciwwrobaczych.

Rotacja pastwisk w hodowli owiec i kóz jest opłacalną i zrównoważoną praktyką, która może poprawić zdrowie zwierząt, zoptymalizować wykorzystanie paszy i wspierać długoterminową produktywność pastwisk i stada.

Jak działa wypas rotacyjny:

- Początek: owce i kozy rozpoczynają wypas na pastwisku nr 1, podczas gdy pastwiska nr 2, 3 i 4 odpoczywają i odrastają.
- Przenoszenie: po ustalonym okresie wypasu (np. 1–2 tygodnie) zwierzęta są przenoszone do pastwiska 2. Pastwisko 1 rozpoczyna teraz okres odpoczynku.
- Ciąg dalszy: proces jest kontynuowany, zwierzęta przemieszczają się sekwencyjnie przez każde pastwisko.
- Cykl: gdy wszystkie pastwiska zostaną wykorzystane, cykl się powtarza, zawsze zapewniając każdemu pastwisku wystarczająco długi okres odpoczynku przed kolejnym wypasem.


Kluczowe elementy:

- Dostęp do wody: umieść źródła wody w centralnym lub innym łatwo dostępnym miejscu, aby zwierzęta miały do niej dostęp niezależnie od lokalizacji pastwiska.
- Ogrodzenie: aby podzielić pastwiska, należy zastosować ogrodzenie stałe lub tymczasowe.
- Okresy odpoczynku: każde pastwisko odpoczywa i regeneruje się, podczas gdy inne są wykorzystywane, co zmniejsza ryzyko nadmiernego zagęszczenia zwierząt i pasożytów.
- Czas rotacji: dostosuj okresy wypasu i odpoczynku na podstawie wzrostu paszy i pory roku (np. 1–2 tygodnie wypasu, 3–6 tygodni odpoczynku).

Alternatywne schematy:

- Ruch zgodnie z ruchem wskazówek zegara/przeciwnie do ruchu wskazówek zegara: Zwierzęta mogą poruszać się w ustalonym kierunku po pastwiskach, wracając na początek po pełnym obrocie.
- Centralne źródło wody (koło wozowe/wypas w kwadrantach): pastwiska rozchodzą się promieniście od centralnego punktu (źródło wody), a zwierzęta przemieszczają się rotacyjnie na zewnątrz.

ROTACJA PASTWISK U MAŁYCH PRZEŻUWACZY



Stosując się do tych wytycznych, hodowcy kóz i owiec mogą wdrożyć strategię rotacji pastwiskami w celu kontrolowania inwazji nicieni żołądkowo-jelitowych. Jednocześnie zmniejszając ryzyko rozwoju oporności na środki przeciwwrobacze w swoich stadach.

